丙酮酸激酶（Pyruvate kinase，PK）试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

PK（EC 2.7.1.40）广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，催化糖酵解过程中的最后一步反应，是糖酵解过程中的主要限速酶之一，也是产生 ATP 的关键酶之一，因此测定 PK 活性具有重要意义。

测定原理：

PK 催化磷酸烯醇式丙酮酸和 ADP 生成 ATP 和丙酮酸，乳酸脱氢酶进一步催化 NADH 和丙酮酸生成乳酸和 NAD^+，在 340nm 下测定 NADH 下降速率，即可反映 PK 活性。

组成：

产品名称	100T/96S	Storage
提取液：液体	100ml	4℃
试剂一：液体	20ml	4℃
试剂二：粉剂	2 瓶	-20℃
试剂三：液体	10μl×2	4℃
说明书	一份	

自备仪器和用品：

紫外分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水

样本的前处理：

1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（10^4 个）：提取液体积（ml）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1ml 提取液），超声波破碎细

菌或细胞（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
2、组织：按照组织质量（g）：提取液体积(ml)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液），进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
3、血清（浆）样品：直接检测。

测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。
2、样本测定
（1）试剂二的配制：临用前取试剂二一瓶，加入 9ml 试剂一和 1.06ml 蒸馏水充分溶解，置于 37℃（哺乳动物）或 25℃（其它物种）水浴 5min；现配现用。
（2）试剂三的配制：临用前取试剂三一支，加入 0.6ml 蒸馏水充分溶解待用；现配现用。
（3）在微量石英比色皿或 96 孔板中加入 10μl 样本、10μl 试剂三和 180μl 试剂二，混匀，立即记录 340nm 处 20s 时的吸光值 A1 和 2min20s 后的吸光值 A2，计算ΔA=A1-A2。

PK 活性计算：

a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下：
1、血清（浆）中 PK 活力的计算:
单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。
PK（nmol/min/ml）=[ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷V 样÷T=1608×ΔA
2、组织、细菌或细胞中 PK 活力的计算:
（1）按样本蛋白浓度计算：
单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。
PK（nmol/min /mg prot）=[ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(V 样×Cpr) ÷T=1608×ΔA÷Cpr
（2）按样本鲜重计算：
单位的定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。
PK（nmol/min /g 鲜重）=[ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(W× V 样÷V 样总)÷T=1608×ΔA÷W
（3）按细菌或细胞密度计算：
单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。
PK（nmol/min /10^4 cell）=[ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(500×V 样÷V 样总)÷T=3.216×ΔA
V 反总：反应体系总体积，2×10^{-4} L；ε：NADH 摩尔消光系数，6.22×10^3 L / mol /cm；d：比色皿光径，1cm；V 样：加入样本体积，0.01 ml；V 样总：加入提取液体积，1 ml；T：反应时间，2min；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml；W：样本质量，g；500：细菌或细胞总数，500 万。

b.用 96 孔板测定的计算公式如下：

1、血清（浆）中 PK 活力的计算:

单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

PK（nmol/min /ml） = [ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷V 样÷T=3216×ΔA

2、组织、细菌或细胞中 PK 活力的计算:

（1）按样本蛋白浓度计算:

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

PK（nmol/min /mg prot） = [ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(V 样×Cpr) ÷T=3216×ΔA÷Cpr

（2）按样本鲜重计算:

单位的定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

PK（nmol/min /g 鲜重） = [ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(W× V 样÷V 样总)÷T=3216×ΔA÷W

（3）按细菌或细胞密度计算:

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

PK（nmol/min /10^4 cell） = [ΔA×V 反总÷（ε×d）×10^9]÷(500×V 样÷V 样总)÷T=6.432×ΔA

V 反总：反应体系总体积，$2×10^{-4}$ L；ε：NADH 摩尔消光系数，$6.22×10^3$ L / mol /cm；d：96 孔板光径，0.5cm；V 样：加入样本体积，0.01 ml；V 样总：加入提取液体积，1 ml；T：反应时间，2min；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml；W：样本质量，g；500：细菌或细胞总数，500 万。